



Gastroscoopia

La gastroscopia è indicata anche in caso di pirosi, dolori non chiari in corrispondenza dello stomaco e della parte superiore dell'addome, disturbi della deglutizione, sensazione di corpi estranei, come pure in caso di anemia e carenza di ferro. Questo esame consente anche di compiere accertamenti in casi di sospetta ulcera gastroduodenale. In presenza di precedenti casi in famiglia (cancro) è consigliabile un controllo preventivo. Con la gastroscopia si esamina approfonditamente la mucosa dell'esofago, dello stomaco e del duodeno con l'ausilio di un gastroscopio. All'occorrenza si possono prelevare in maniera indolore alcuni campioni di mucosa nei diversi tratti d'interesse. Con questo esame si asportano anche eventuali polipi in maniera indolore. Tutti i campioni vengono poi inviati a un laboratorio specializzato per essere esaminati.

Preparazione alla gastroscopia

Fino a sei ore prima dell'esame è consentito assumere cibi leggeri. Non consumare alimenti contenenti grassi o difficilmente digeribili. Fino a tre ore prima dell'esame è consentito bere un bicchiere di tè o di acqua. Dopo non è più consentito fumare, assumere antiacidi né fare uso di gomme da masticare.

Svolgimento della gastroscopia

Il giorno dell'esame la aspettiamo all'orario concordato presso il nostro studio. Pianifichiamo le nostre procedure in modo da evitarle tempi di attesa, per quanto possibile. Nel colloquio preliminare il medico discuterà con lei

il quadro completo dei suoi disturbi, approfondendo eventuali domande o incertezze da parte sua. Per rendere l'esame il meno sgradevole possibile, le verrà dato un medicamento rilassante (anestetico di breve durata) che garantirà uno svolgimento ottimale e indolore della gastroscopia.

L'esame vero e proprio dura appena 15 minuti circa. Al termine avverrà un secondo colloquio con il medico, il quale le spiegherà l'esito e risponderà alle sue domande.

Dopo l'esame

La preghiamo di non recarsi all'esame in auto, oppure le consigliamo di farsi accompagnare da qualcuno; i medicinali che somministriamo riducono la capacità di condurre veicoli.

Salvo diversa prescrizione o indicazione del medico, subito dopo l'esame lei potrà nuovamente mangiare e bere come di consueto.

I risultati dell'esame le saranno comunicati immediatamente. Per ricevere la valutazione dei campioni di tessuto prelevati occorre attendere due o tre giorni. Qualora emergessero elementi rilevanti, la informeremo prontamente. In ogni caso invieremo un referto al suo medico di famiglia.

